

Ciclo: medio

Utilizzo: fieno, pascolo invernale, insilato, foraggio verde.

Descrizione:

- Elevati livelli di digeribilità della fibra, contenuto in zuccheri, resa in UFL.
- Possibilità di ottenere più tagli primaverili di solo loietto.
- Varietà speciali molto produttive, nei terreni migliori.

| Composizione | Specie | % in peso |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| | • Loietto westervoldico tetraploide | 25 |
| | • Loietto westervoldico diploide | 15 |
| | • Avena nera | 15 |
| | • Avena bianca | 25 |
| | • Avena gigante | 10 |
| | • Avena bionda | 10 |

Dose di semina 75-80 kg/ha, alla profondità di 2-3 cm in funzione del tipo di terreno e della preparazione del letto di semina.

Epoca di semina

- Autunnale: con pascolamento invernale seminare da settembre a metà ottobre, per solo sfalcio a fieno, seminabile fino a novembre.
- Primaverile: consigliata solo al centro nord fino ad inizio marzo.

Concimazione Apportare complessivamente 100-110 unità di N/ha. In base alle dotazioni del suolo, integrare alla semina con 60-70 unità/ha di P e altrettante di K.

Epoca di raccolta Può essere pascolato dall'inverno alla primavera e in seguito sfalcato. Per la produzione di fieno si consiglia di tagliare prima della spigatura dell'avena, mentre per insilato o fasciato si può attendere l'inizio delle spigature per massimizzare le rese.