



Nanut foal



NANUT FOAL

Mangime complementare d'allattamento
per puledri

Quantitativo netto: Secchiello da **600 g - 5 kg - 10 kg**

Per integrare o sostituire il latte materno nell'alimentazione del puledro neonato e facilitare lo svezzamento.

COMPOSIZIONE

Latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, sciroppo di glucosio, destrosio, olio vegetale di palma, siero di latte in polvere delattosato, farina di frumento, olio vegetale di cocco, cloruro di sodio, solfato di magnesio anidro, bicarbonato di sodio, farina di riso, saccarosio, cloruro di potassio, fosfato monopotassico.

ADDITIVI PER KG

Vitamine

(3a672a) Vitamina A	20.000 UI
(3a671) Vitamina D3	5.000 UI
(3a700) Vitamina E	150 mg
(3a711) Vitamina K3	5 mg
(3a821) Vitamina B1	5 mg
(3a825i) Vitamina B2	3 mg
(3a315) Niacinamide	53 mg
(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloridrato)	1,5 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	0,075 mg
(3a300) Vitamina C	53 mg
(3a841) Calcio - D - pantotenato	10,5 mg
(3a316) Acido folico	0,5 mg
(3a890) Colina cloruro 1	50 mg

Oligoelementi

Ferro (3b103)	
Ferro (II) solfato monoidrato	25,7 mg
Selenio (3b801) Selenito di sodio	0,15 mg
Iodio (3b201) Ioduro di potassio	7,64 mg

Additivi tecnologici

(E320) Butilidrossianisolo (BHA)	16 mg
(E321) Butilidrossitoluolo (BHT)	8 mg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	17,68 %
Cellulosa grezza	0,79 %
Oli e grassi grezzi	8,25 %
Ceneri grezze	7,30 %
Sodio	0,84 %
Lisina	1,5 %
Metionina	0,43 %
Cistina	0,17 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Sciogliere la polvere di NANUT FOAL in acqua calda, mescolare energicamente e somministrare a temperatura di circa 40 °C fin dal primo giorno di vita dopo l'assunzione del colostro. Le quantità di polvere e acqua per ricostituire NANUT FOAL sono indicate negli schemi di razionamento. Tenere sempre a disposizione acqua pulita. Non conservare in frigorifero il latte ricostituito avanzato ed eliminarlo dopo ogni poppata. Lavare bene i recipienti utilizzati per ricostituire e somministrare il latte. La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata. Per ulteriori informazioni o approfondimenti sull'alimentazione del neonato è consigliabile rivolgersi a personale specializzato.

Mangimi complementari per puledri, fattrici e stalloni / **NANUT FOAL**

SCHEMA DI RAZIONAMENTO

Puledri con peso alla nascita > a 50 kg

Nanut foal

ETÀ DEL PULEDRO PESO ALLA NASCITA > 50 kg	NUMERO PASTI AL GIORNO	PER RICOSTITUIRE OGNI PASTO		DOSE DI LATTE RICOSTITUITO AL GIORNO (litri)
		POLVERE DI LATTE (g)	ACQUA (ml)	
0 - 3 giorni	24	25	225	5,5
4 giorni	16	60	540	9
5 giorni	16	70	630	10
6 giorni	16	80	720	11,5
7 giorni	16	90	810	13
2 ^a settimana	12	140	1.260	15
3 ^a settimana	8	220	1.980	16
4 - 5 ^a settimana	6	300	2.700	16,5
6 - 8 ^a settimana	6	350	3.150	19
9 - 12 ^a settimana	6	400	3.600	22
13 - 14 ^a settimana	6	425	3.825	23

SCHEMA DI RAZIONAMENTO

Puledri con peso alla nascita < a 50 kg

ETÀ DEL PULEDRO PESO ALLA NASCITA < 50 kg (PSA)	NUMERO PASTI AL GIORNO	PER RICOSTITUIRE OGNI PASTO		DOSE DI LATTE RICOSTITUITO AL GIORNO (litri)
		POLVERE DI LATTE (g)	ACQUA (ml)	
0 - 7 giorni	24	20	180	4,5
2 ^a settimana	24	50	450	11
3 ^a settimana	16	90	810	13
4 - 5 ^a settimana	12	125	1.125	14
6 - 8 ^a settimana	12	160	1.440	18
9 - 12 ^a settimana	12	180	1.620	20
13 - 14 ^a settimana	12	200	1.800	22